АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Алексеев А. Н., см. Бибикова В. А. и Алексеев А. Н., 3 : 196—202.
Алексеев А. Н., Бибикова В. А. и Хрусцелевская Н. М. Некоторые доказательства существования бактерицидного фактора в организме кровососов на примере блох — переносчиков чумы, 3 : 228—235.
Алексеев В. М., см. Ошмарин П. Г., Алексеев В. М. и Сметания З. Б., 3 : 244—248.
Алигаджиев А. Д. Влияние длительного осушения водоема на паразитофауну его рыб, 2 : 144—148.
Алигаджиев А. Д. О влиянии размеров и типа водоема на паразитофауну рыб Дагестана, 4 : 340—345.
Афанасьева О. В., см. Золотова С. И. и Афанасьева О. В., 4 : 301—308.
Ахунджанов А. И., см. Сафаев А. С., Дремова В. П., Махсумов А. Г., Ахунджанов А. И. и Файзиев Т. Ф., 1 : 38—39.

Балашов Ю. С. и Дайтер А. Б. Интенсивность газообмена у клещей Hyalomma asiaticum P. Sch. et E. Schl., зараженных риккетсиями Coxiella burneti и Dermacentroxenus sibiricus, 1 : 12—16.
Балашов Ю. С., Дайтер А. Б. и Станюкович А. К. Влияние инфицирования риккетсиями Coxiella burneti и Dermacentroxenus sibiricus на содержание свободных аминокислот в организме клеща Hyalomma asiaticum, 4 : 281—286.
Баранников В. Д. Влияние ионизирующего излучения на Hyalomma anatolicum Koch, 1844, 3 : 213—218.
Белозеров В. Н. Реакция личинок и нимф Haemaphysalis concinna Koch на длину дня, 1 : 17—21.
Белопольская М. М. Характер фауны трематод куликов в различных районах Советского Союза, 5 : 426—430.
Беляев В. Г. Фауна и некоторые вопросы экологии гамазовых клещей леммингов на о. Врангеля, 6 : 493—500.
Бергер В. Я. Сопоставление солевой резистентности беломорского моллюска Hydrobia ulvae (Pennant) и паразитирующих в нем личинок трематод, 2 : 158—163.
Бердыев А. Паразитирование Hyalomma dromedarii Koch на сельскохозяйственных животных в предгорных районах Туркмении, 4 : 287—291.
Бессонова М. А., см. Ульянова Н. И., Бессонова М. А., Захарова В. В., Кленов К. Н. и Сухомлинова О. И., 3 : 223—227.
Бибикова В. А. и Алексеев А. Н. Зараженность и блокообразование в зависимости от количества попавших в блох микробов чумы, 3 : 196—202.
Бибикова В. А., см. Алексеев А. Н., Бибикова В. А. и Хрусцелевская Н. М., 3 : 228—235.
Бисли В. Н. и Бреев К. А. Серологические реакции морских свинок на личинок и экстракты из личинок подкожных оводов — Oedemagena tarandi L. и Hypoderma bovis De Geer, 5 : 472—477.
Божков, Димо Кирилов. О поливалентных хозяевах гельминтов, 3 : 253—257.
Бреев К. А., см. Бисли В. Н. и Бреев К. А., 5 : 472—477.
Бреев К. А. и Обрежа Г. Н. Об антигенных свойствах субстратов, получаемых из личинок I и III стадий подкожного овода северного оленя, 6 : 489—492.
Бричук П. Ф. Cryptobia cyprini Plehn, 1903 (Flagellata, Bodonidae) как причина гибели белых амуров, 6 : 574—576.
Быховская-Павловская И. Е. и Микаилов Т. К. Некоторые материалы к систематике дигенетических сосальщиков рода Skrjabinopsolus Ivanov, 1934, 2 : 164—167.
Быховский Б. Е. и Нагибина Л. Ф. Ancyrocephalinae (Dactylogyridae Monogenoidea) рыб семейства Ariidae, 4 : 357—368.
Быховский Б. Е. и Нагибина Л. Ф. Новые роды моногенетических сосальщиков подсемейства Ancyrocephalinae (Dactylogyridae), 6 : 518—527.

Ващенок В. С. и Солина Л. Т. О пищеварении у блох Xenopsylla cheopis Roths. (Aphaniptera, Pulicidae), 5 : 451—460.

Веремчук Г. В. Новый вид энтомопатогенных нематод рода Neoaplectana (Rhabditida : Steinernematidae), 3 : 249—252.
Витинг А. И. О паразитарной природе рассеянного или множественного склероза, 6 : 569—573.
Власенко М. И. Устойчивость церкарий Diplostomum spathaceum Rud., 1819 к ультрафиолетовому облучению, 5 : 420—425.
Вышкварцева Н. В. Морфология фаз развития сосальщика Metorchis intermedius (Opisthorchiidae из баклана), 4 : 346—353.
Фан Тхе Вьет, см. Петроченко и Фан Тхе Вьет, 4 : 375—377.

Гаврилова Н. Г. Инфузория Stentoropsis barbi — паразит кишечника усачей из водоемов Средней Азии, 5 : 393—398.
Герасимова Н. Г. Гигротермические условия развития преимагинальных фаз двух видов блох большой песчанки, 1 : 24—33.
Гинтовт Ф. В. Метацеркарии из головного мозга ручьевой миноги (Lampetra planeri), 6 : 539—541.
Глухова В. М. Описание личинок кровососущих мокрецов рода Culicoides (Ceratopogonidae), 5 : 461—467.
Губина В. Г. Динамика численности нематод в корнях и ризосфере сеянцев хвойных пород, 4 : 378—384.
Гудима О. С., см. Кокорин И. Н., Сидоров В. Е. и Гудима О. С., 3 : 193—195.

Дайтер А. В., см. Балашов Ю. С. и Дайтер А. Б., 1 : 12—16.
Дайтер А. В., см. Балашов Ю. С., Дайтер А. Б. и Станюкович А. К., 4 : 281—286.
Дворядкин В. А. О биологии Eurytrema pancreaticum (Janson, 1889) в верхнем Приамурье, 5 : 431—435.
Дремова В. П., см. Сафаев А. С., Дремова В. П., Махсумов А. Г., Ахунджанов А. И. и Файзиев Т. Ф., 1 : 38—39.
Дубинина Е. В. Волосяные клещи рода Lynxacarus (Sarcoptiformes, Listrophoridae), 5 : 440—450.
Дубицкий А. М. Экологические обоснования мероприятий по борьбе с комарами в горных и предгорных районах Казахстана, 1 : 34—37.
Дуденкова В. Г., см. Петров В. Г. и Дуденкова В. Г., 1 : 3—11.
Дьяченко Г. В. Новый вид пресноводного паразитического рачка, 6 : 554—558.

Евдокимова Е. Б. Новые виды моногенетических сосальщиков костистых рыб Патагонского шельфа, 5 : 415—419.

Заика В. Е., см. Найденова Н. Н. и Заика В. Е., 1 : 97—101.
Зайниев С. А. Ход сезонного отрождения личинок и возрастной состав самок Aedes caspius caspius Pall., в Узбекистане, 2 : 140—143.
Захарова В. В., см. Ульянова Н. И., Бессонова М. А., Захарова В. В., Кленов К. Н. и Сухомлинова О. И., 3 : 223—227.
Зеленцов Н. И., см. Изюмова Н. А. и Зеленцов Н. И., 6 : 528—531.
Золотова С. И. и Афанасьева О. В. К биологии Xenopsylla gerbilli minax Jord., 1926, 4 : 301—308.

Изюмова Н. А. и Зеленцов Н. И. Наблюдения над развитием Dactylogyrus extensus Müller et V. Cleave, 1932, 6 : 528—531.
Исмаилов С. Г., см. Мусаев М. А. и Исмаилов С. Г., 2 : 176—184.

Катайцева Т. В. К биологии Dipetalonema evansi Lewis, 1882 — паразита верблюдов, 1 : 76—80.
Кербабаев Э. Б., Кравчени Г. Н. и Мальцман Т. С. Результаты авиаопрыскивания карбофосом против личинок комаров рода Aedes в условиях северной тайги, 1 : 40—41.
Кирьянова Е. С. О структуре субкристаллического слоя у нематод рода Heterodera (Nematoda : Heteroderidae) с описанием двух новых видов, 1 : 81—91.
Кленов К. Н., см. Ульянова Н. И., Бессонова М. А., Захарова В. В., Кленов К. Н. и Сухомлинова О. И., 3 : 223—227.
Кокорин И. Н., Сидоров В. Е. и Гудима О. С. Некоторые особенности развития риккетсий в организме клещей, 3 : 193—195.
Коновалов С. М. Зоогеографический анализ паразитофауны рыб Тихоокеанской провинции, 4 : 331—339.
Коновалов С. М., Коновалова Г. В. Дифференциация локальных стад красной Oncorhynchus nerka по паразитам-индикаторам, 1 : 42—52.
Коновалова Г. В., см. Коновалов С. М. и Коновалова Г. В., 1 : 42—52.
Контримавичус В. Л. Гельминтофауна куньих горного Алтая, 5 : 406—410.
Корниенко З. П., см. Мозговой А. А., Корниенко З. П. и Шахматова В. И., 2 : 174—175.

Корнюшин В. В. Цестоды рода Echinocotyle Blanchard, 1891 (Hymenolepididae) из куликов Украины, 6 : 542—550.
Королева Ю. И. Кариология некоторых видов Diplozoon, 5 : 411—414.
Котикова Е. А. Холинэстераза трематод и некоторые особенности строения их нервной системы, 6 : 532—538.
Кочетов А. Х., см. Новокрещенова Н. С., Кочетов А. Х. и Старожицкая Г. С., 3 : 203—212.
Кравчени Г. Н., см. Кербабаев Э. Б., Кравчени Г. Н. и Мальцман Т. С., 1 : 40—41.
Крылов М. В. и Крылова Н. П. Продолжительность выживания личинок и нимф Hyalomma anatolicum Koch, 1884, зараженных Nuttallia tadzhikistanica (Krylov et Zanina, 1963), 3 : 219—222.
Крылов М. В. и Крылова Н. П. Восприимчивость восьми линий мышей к Nuttallia musculi Muratov, 4 : 385—388.
Крылова Н. П., см. Крылов М. В. и Крылова Н. П., 3 : 219—222.
Крылова Н. П., см. Крылов М. В. и Крылова Н. П., 4 : 385—388.
Крючечников В. Н. и Сидоров В. Е. Распределение риккетсий Dermacentroxenus sibiricus в организме клеща Dermacentor marginatus Sulz. на разных фазах его развития, 2 : 110—114.
Кудряшова Н. И., см. Шлугер Е. Г. и Кудряшова Н. И., 2 : 115—122.
Куничкин Г. И. Учет зараженности скота при подкожнооводовой инвазии, 4 : 309—313.

Ладыгина Н. М. О физиологической совместимости разных форм стеблевых нематод. I. Скрещивание дитиленхов лука, земляники и клевера, 6 : 559—568.
Лебедев Б. И. Обоснование нового рода Kahawaia gen. n. для Gonoplasius truttae Dillon et Hargis, 1965 (Monogenoidea : Microcotylidae), 1 : 69—73.
Лебедев Б. И. Дискоррелятивно-симметричные гетеротопии органов у моногеней Pentatres sphyraenae, 2 : 149—157.

Мальцман Т. С., см. Кербабаев Э. Б., Кравчени Г. Н. и Мальцман Т. С., 1 : 40—41.
Махмутов С. М., см. Сенотрусова В. Н. и Махмутов С. М., 2 : 128—131.
Махсумов А. Г., см. Сафаев А. С., Дремова В. П., Махсумов А. Г., Ахунджанов А. И. и Файзиев Т. Ф., 1 : 38—39.
Метлицкий О. З. Влияние различных растений-хозяев на размеры и пропорции тела земляничного дитиленха, 3 : 266—272.
Микаилов Т. К., см. Быховская-Павловская И. Е. и Микаилов Т. К., 2 : 164—167.
Мирзаева А. Г. О фауне мокрецов рода Culicoides (Ceratopogonidae) северных районов Сибири, 4 : 320—328.
Мозговой А. А., Корниенко З. П. и Шахматова В. И. Ascaris skrjabini sp. n. (Ascaridata) — паразит верблюда, 2 : 174—175.
Мулярская Л. В. Некоторые аспекты проявления специфичности у клещей тромбикулид (Acariformes, Trombiculidae), 2 : 123—127.
Мусаев М. А. и Исмаилов С. Г. Изменчивость ооцист Eimeria scnamchorica Musajev et Alijeva, 1961 — паразита краснохвостой песчанки, 2 : 176—184.
Мусселиус В. А. Паразиты растительноядных рыб дальневосточного комплекса при выращивании в прудовых хозяйствах европейской части СССР, 3 : 236—243.
Мухин В. Н. Об антигенной дифференциации частей стробил бычьего цепня, 4 : 369—374.

Нагибина Л. Ф., см. Быховский Б. Е. и Нагибина Л. Ф., 4 : 357—368.
Нагибина Л. Ф., см. Быховский Б. Е. и Нагибина Л. Ф., 6 : 518—527.
Найденова Н. Н. и Заика В. Е. Два новых вида простейших из рыб Черного моря, 1 : 97—101.
Нгуен Тхи Ле. Три новых вида трематод птиц и млекопитающих из Демократической Республики Вьетнам, 2 : 168—173.
Новокрещенова Н. С., Кочетов А. Х. и Старожицкая Г. С. Зависимость образования чумного блока у блох от интенсивности их заражения возбудителем чумы и условий питания, 3 : 203—212.

Обрежа Г. Н., см. Бреев К. А. и Обрежа Г. Н. 6 : 489—492.
Осипова Н. З. Сезонные явления в популяции клещей Allodermanyssus sanguineus Hirst в Чуйской долине Киргизии, 6 : 501—504.
Остроушко Т. С. О фауне и экологии кровососущих мокрецов рода Culicoides (Diptera, Ceratopogonidae) юга Коми АССР, 5 : 468—471.
Ошмарин П. Г., Алексеев В. М. и Сметанина З. Б. Новые представители рода Basantisia Pande, 1938, и положение этого рода в системе трематод, 3 : 244—248.

Паенко Н. К. О плодовитости и гонотрофическом цикле слепня Hybomitra tropica Pz., 2 : 132—139.

Панова И. В., см. Ушакова Г. В., Филиппова Н. А. и Панова И. В., 5 : 436—439.
Первомайский Г. С. и Чагин К. П. Основные этапы становления и развития учения о природной очаговости болезней, 6 : 481—488.
Петров В. Г. и Дуденкова В. Г. Слюнно-ротовой механизм передачи туляремийных бактерий клещами Dermacentor marginatus Sulz. теплокровным животным, 1 : 3—11.
Петроченко В. И. и Фан Тхе Вьет. Gordiorhynchus hagiangensis Petrotschenko et Phan sp. n. (Acanthocephala, Gigantorhynchidae), 4 : 375—377.
Пойманская Т. Изменчивость Leucochloridium phragmitophyla Bych.-Pawl. et M. Dub., 1951 (Trematoda : Brachylaemidae) из разных хозяев, 1 : 63—68.
Пронин Н. М. Влияние цлероцеркоидов Triaenophorus bodulosus на показатели крови налима, 2 : 185—187.

Равкин Ю. С., см. Сапегина В. Ф. и Равкин Ю. С., 1 : 22—23.
Ремянникова Т. Н. Особенности популяционной биологии норовых москитов в природном очаге кожного лейшманиоза в Туркмении, 4 : 314—319.

Савулкина М. М. О структуре рода Pygmephorus Kramer, 1877 (Trombidiformes, Tarsonemini, Pyemotidae), 6 : 510—517.
Сапегина В. Ф. и Равкин Ю. С. О находках Ixodes pavlovskyi Pom. в северо-восточном Алтае, 1 : 22—23.
Сафаев А. С., Дремова В. П., Махсумов А. Г., Ахунджанов А. И. и Файзиев Т. Ф. Репеллентные свойства N-бензоилпроизводных пиперидина и некоторых его гомологов, 1 : 38—39.
Сенотрусова В. Н. и Махмутов С. М. Биология Hirstionyssus myospalacis Zemsk. et Piontkovsk., 1957 (Parasitiformes : Gamasoidea) — паразита алтайского цокора, 2 : 128—131.
Сидоров В. Е., см. Кокорин И. П., Сидоров В. Е. и Гудима О. С., 3 : 193—195.
Сидоров В. Е., см. Крючечников В. Н. и Сидоров В. Е., 2 : 110—114.
Скрябин А. С. Новая нематода Crassicauda costata sp. n. — паразит южного кита, 3 : 258—265.
Сметанина З. В., см. Ошмарин П. Г., Алексеев В. М., Сметанина З. Б., 3 : 244—248.
Солоненко И. Г. Обнаружение цистицеркоидов Hymenolepis nana в брыжеечных лимфатических узлах лабораторных крыс, 1 : 74—75.
Соснина Е. Ф. Мышевидные грызуны как прокормители иксодовых клещей в лесном поясе горного Крыма, 6 : 505—509.
Соснина Е. Ф. и Тихвинская М. В. Зараженность вшами водяной полевки в Волжско-Камском крае, 4 : 292—300.
Стадниченко А. П. О воздействии личиночных форм трематод на органы воспроизведения их промежуточных хозяев — брюхоногих моллюсков, 1 : 53—57.
Станюкович А. К., см. Балашов Ю. С., Дайтер А. Б. и Станюкович А. К., 4 : 281—286.
Старожицкая Г. С., см. Новокрещенова Н. С., Кочетов А. Х. и Старожицкая Г. С., 3 : 203—212.
Сухомлинова О. И., см. Ульянова Н. И., Бессонова М. А., Захарова В. В., Кленов К. Н. и Сухомлинова О. И., 3 : 223—227.

Теравский И. К., см. Шустров А. К. и Теравский И. К., 3 : 273—278.
Тихвинская М. В., см. Соснина Е. Ф. и Тихвинская М. В., 4 : 292—300.
Тропин Н. Н. О вероятной истории туляремийного очага в низовьях Волги в связи с прежним распространением водяной полевки (Arvicola terrestris L.), 2 : 105—109.

Ульянова Н. И., Бессонова М. А., Захарова В. В., Кленов К. Н. и Сухомлинова О. И. Иксодовые клещи Ленинградской области как хранители возбудителей некоторых бактериальных болезней человека и животных, 3 : 223—227.
Ушакова Г. В., Филиппова Н. А. и Панова И. В. О видах группы Ixodes persulcatus (Parasitiformes, Ixodidae). IV. Новые данные по экологии Ixodes pavlovskyi Pom. в Восточном Казахстане, 5 : 436—439.

Файзиев Т. Ф., см. Сафаев А. С., Дремова В. П., Махсумов А. Г., Ахунджанов А. И. и Файзиев Т. Ф., 1 : 38—39.
Фейзуллаев Н. А. Жизненный цикл Hyptiasmus oculeus (Trematoda, Cyclocoeliidae) паразита носовых и орбитальных полостей лысухи (Fulica atra L.), 1 : 58—62.

Филиппова Н. А., см. Ушакова Г. В., Филиппова Н. А. и Панова И. В., 5 : 436—439.

Хрусцелевская Н. М., см. Алексеев А. Н., Бибикова В. А. и Хрусцелевская Н. М., 3 : 228—235.

Чернобай В. Ф. Новый вид нематод. Encephalonema ophthaltina sp. n. из глаз врановых птиц, 6 : 551—553.

Шамрай А. Ф. Видовая чувствительность комаров к репеллентам, 4 : 329—330.
Шаова Н. Д. Миксоспоридии нижнего и среднего течения р. Кубани, 1 : 92—96.
Шаова Н. Д. Влияние паводков на паразитофауну рыб бассейна р. Кубани, 5 : 399—405.
Шахматова В. И., см. Мозговой А. А., Корниенко З. П. и Шахматова В. И., 2 : 174—175.
Шлугер Е. Г. и Кудряшова Н. И. Новые и впервые обнаруженные в СССР виды краснотелок (Acariformes, Trombiculidae), 2 : 115—122.
Шустров А. К. и Теравский И. К. Клещи рода Ornithodoros как возможные хранители и переносчики Toxoplasma gondii, 3 : 273—278.

Юрахно М. В. Pricetrema erignathi sp. n. (Trematoda : Heterophyidae) — паразит лахтака, 4 : 354—356.